

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES RHONE-ALPES

AIN, ARDECHE, DROME, ISERE, LOIRE, RHONE SAVOIE, HAUTE-SAVOIE

ARBO. VITI. RHONE-ALPES

ABONNEMENT ANNUEL : 100f

REGISSEUR RECETTES D.D.A. CCP LYON 9431-17A



Circonscription RHONE-ALPES

55, rue Mazenod 69426 LYON CEDEX 3

30 Mai 1985

N° de série continue 300

Bulletin n° 12

VIGNE

MILDIOU	: <u>Traitement généralisé</u> - . dès réception en Beaujolais . la semaine prochaine dans les autres secteurs.
OIDIUM	: Attention à la floraison.
BLACK ROT et ROUGEOT	: Rien à signaler.
VERS DE LA GRAPPE	: Trop tôt pour traiter.
GRELE	: Que faire ?

MILDIOU

. Un seul foyer primaire a été signalé dans le Beaujolais.

Un traitement généralisé s'impose dès réception dans ce secteur avec un produit de type Curzate.

. Dans les autres zones, aucun foyer n'a été signalé, mais compte-tenu :

. des conditions météorologiques (températures élevées et orages fréquents)

. de l'approche de la floraison (stade H atteint en zones précoces du Beaujolais et en Vallée du Rhône).

UNE PROTECTION GENERALISEE S'IMPOSE.

Elle sera mise en place dès le début de la semaine prochaine dans les zones les plus précoces (Vallée du Rhône), en fin de semaine dans le reste de la région Rhône-Alpes.

Produits :

le cymoxanil pur est à l'abri du lessivage, mais les spécialités "cymoxanil + produit de contact" s'emploient comme un fongicide de contact, avec renouvellement en cas de pluies importantes.

Toutefois, en cette période de début de campagne, ces spécialités ont l'avantage de permettre plus de souplesse d'emploi et de sécurité grâce à l'effet curatif du cymoxanil.

. L'emploi des Anilides en 1er traitement est déconseillé. Respectez les conseils d'emploi qui vous ont été donnés dans la note sur le "mildiou résistant".

P. 529

OIDIUM

Les risques sont peu importants actuellement mais à l'approche de la floraison, la protection devra être parfaite.

Les produits utilisables ont été mentionnés dans notre bulletin n° 8.

Un traitement mixte mildiou-oïdium peut être effectué avec les spécialités suivantes : Diamétan (2,5 kg/ha) ou Alliance (3 kg/ha).

BLACK ROT et ROUGEOT PARASITAIRE

Les conditions météorologiques de ce printemps n'ont pas été favorables à leur installation.

Toutefois, dans les foyers habituels, choisissez un anti-mildiou efficace sur ces maladies.

VERS DE LA GRAPPE

Les toutes lères pontes ont été observées mais elles sont très peu nombreuses.

IL EST ENCORE TROP TOT POUR TRAITER.

En lère génération, un traitement curatif suffit. Il ne se fera que lorsque l'on aura noté la présence de nombreux glomérules.

GRELE : soyez prêts, il faudra agir très vite ...

Les blessures provoquées par la grêle favorisent le développement de certains parasites, en particulier celui de l'agent responsable du Rot-Blanc ou Coître.

Une pulvérisation avec l'un des produits suivants :

- | | | |
|------------------|---|------------------|
| . folpel | à | 300 g de m.a./hl |
| . captane | à | 500 g de m.a./hl |
| . dichlofluanide | à | 200 g de m.a./hl |

est conseillée DANS LES 18 HEURES APRES LA GRELE.

Ce délai est IMPERATIF : toute intervention réalisée au-delà de 24 heures après la grêle, sera d'une efficacité très réduite, voir inutile.

ARBRES FRUITIERS

TAVELURES DU POMMIER ET DU POIRIER

De violents orages se sont abattus ces jours sur plusieurs points de la circonscription. Nous rappelons que tout produit est lessivé lorsque la pluviométrie dépasse 20mm. Il est donc nécessaire dans ces secteurs d'effectuer un traitement curatif pour empêcher les contaminations et de maintenir ensuite la protection par un produit classique.